

Farmiflor PX

REG. Q-10169-051

Fórmula: Florfenicol 40 g
Excipiente c.b.p. 1,000 g

PREMEZCLA MEDICADA

ANTIMICROBIANO

USO VETERINARIO



INDICACIONES:

Antimicrobiano de amplio espectro indicado para el tratamiento de infecciones respiratorias y digestivas en aves (Pollo de engorda, remplazo, reproductoras) y porcinos (Destete, Crecimiento y Finalización), ocasionadas por microorganismos Gram+ y Gram -, susceptibles al Florfenicol como: Actinobacillus sp, Pasteurella sp, Haemophilus sp, Actinomyces sp, Salmonella cholerasuis, Erysipelotrix rhusiopathiae, Escherichia coli, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus sp y Staphylococcus sp.

ESPECIES:

Porcinos (Destete, Crecimiento y Finalización).

Aves:(engorda, remplazo, reproductoras).

Calidad en...

tu Producción



VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral, mezclado en el alimento.

DOSIS:

PORCINOS: Adicionar 1 kg /tonelada de alimento equivalente a 20 mg/kg de Florfenicol 5 a 7 días consecutivos.

AVES: Adicionar 1 kg /tonelada de alimento equivalente a 20 mg/kg de Florfenicol de 5 a 7 días consecutivos.

ADVERTENCIAS:

- No utilizar simultáneamente con otros antimicrobianos.
- **PORCINOS:**
 - No usar en finalización de cerdos, destinados al consumo humano.
 - No utilizar en verracos destinados a la reproducción.
 - No administrar en casos de reacciones alérgicas al Florfenicol.
 - Se ha observado que después de la administración se puede presentar diarrea, inflamación perianal y prolapso rectal. También se puede observar aumento de calcio en suero.
 - **Gestación, lactancia y fertilidad:** La seguridad del producto durante la gestación y la lactancia no se ha estudiado en las cerdas. Por lo tanto, no se recomienda la administración durante la gestación y la lactancia.
 - **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** No se conocen.
- **AVES:**
 - No usar el producto en gallinas ponedoras 20 días antes de romper postura.
 - No usar el producto en aves de postura en etapa de producción de huevo para consumo humano.
 - Manténgase alejado de los niños.
 - Manténgase en un lugar fresco y seco por debajo de 25°C, protegido de la luz solar directa.
 - **Tiempo de retiro:** No se administre este producto 7 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
 - No se administre este producto en aves cuyos huevos son destinados al consumo humano.
 - **Seguridad ambiental:** los envases y los residuos de FARMIFLOR PX, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT.

PRESENTACIÓN:

Saco multicapas
25 Kg.



Calidad en...
tu Producción

ELABORADO
Y DISTRIBUIDOR



- Literatura exclusiva para el Médico Veterinario.

 /TMV FARM

tmvfarm.com

 @tmv_farm

Tel. 33 1028 1009 / 33 1028 1315

Pto. Topolobampo No. 92 Zapopan, Jal. Col. Miramar C.P. 45060