

# Amprosulf L<sup>®</sup>

Reg. Q-10169-004



## Fórmula:

Amprolio	125 g
Sulfaquinoxalina	80 g
Vehículo c.b.p.	1,000 ml

## FORMULACIÓN SINÉRGICA PARA EL CONTROL DE LA COCCIDIOSIS

### Descripción:



Para la prevención y tratamiento de la Coccidiosis intestinal y cecal en pollos, gallinas y pavos, ocasionadas por *Eimeria necatrix*, *E. tenella*, *E. acervulina*, *E. máxima*, *E. brunetti*. El producto, proporciona mayor eficacia en el control de brotes de especies mixtas de coccidias.

### Especies:

Aves (engorda, remplazo, reproductoras) pavos.



Calidad en...  
tu Producción



### Dosificación:

Aves: administrar 1 a 2 litros de AMPROSULF - L / 1,000 litros de agua de bebida, equivalente a 20 mg / kg de peso corporal de Amprolio y 10 mg / kg de Sulfaquinoxalina, por 48 horas seguidas.

### Advertencias:

- Tiempo de retiro: 10 días, antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No consumir productos derivados comestibles hasta 10 días después de la última aplicación.
- Seguridad ambiental: los envases y residuos de AMPROSULF - L, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consulte al médico veterinario.
- Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

*Calidad en...*  
*tu Producción*



### Presentación:

- 1 Lt.
- 5 Lt.
- 20 Lt.



• Literatura exclusiva para el Médico Veterinario.

 /TMV FARM

[tmvfarm.com.mx](http://tmvfarm.com.mx)

 @tmv\_farm

Tel. 33 1028 1009 / 33 1028 1315

Pto. Topolobampo No. 92 Zapopan, Jal. Col. Miramar C.P. 45060